




SUSPENSÃO DE MEDICAMENTOS PRÉ-OPERATÓRIO



GRUPO DE
ANESTESIOLOGISTAS
ASSOCIADOS
PAULISTA



HIPOGLICEMIANTE



MEDICAÇÕES	NOMES	SUSPENSÃO
Metformina	<i>Glifage®</i>	Não tomar no dia (24h antes)
Sulfonilureias	<i>Glipizida (Minidiab®)</i> <i>Glibenclamida (Daonil®)</i> <i>Glimepirida (Amaryl®)</i> <i>Glicazida (Diamicron®MR)</i>	24h
Glinidas	<i>Nateglinida (Starlix®)</i> <i>Repaglinida (Prandin®)</i>	24h
Inibidores da DPP4	<i>Linagliptina (Trayenta®)</i> <i>Sitagliptina (Januvia®)</i> <i>Vildagliptina (Galvus®)</i> <i>Saxagliptina (Onglyza®)</i>	Não suspender
Inibidores do SGLT2	<i>Canaglifozina (Invokana®)</i> <i>Dapaglifozina (Forxiga®, Xigduo XR®)</i> <i>Empaglifozina (Jardiance®)</i>	3-4 dias
Análogos do GLP-1	<i>Lixisenatida (Lyxumia®)</i> <i>Liraglutida (Victoza® e Saxenda®)</i> <i>Dulaglutida (Trulicity®)</i> <i>Tirzepatida (Mounjaro®)</i> <i>Semaglutida (Rybelsus® e Ozempic®)</i>	1 dia 2 dias 15 dias 21 dias



GRUPO DE
ANESTESIOLOGISTAS
ASSOCIADOS
PAULISTA

ANTICOAGULANTES

MEDICAÇÕES	NOMES	SUSPENSÃO
Heparina não fracionada (HNF)	HNF 15.000U por dia (profilático baixa dose)	SC 4-6h
	HNF 7.500-10.000U 2x/ dia ou dose diária <20.000U (profilático alta dose)	SC 12h
	HNF >10.000U por dose ou dose diária >20.000U (terapêutico)	SC 24h
Heparina não fracionada (EV)	Heparina não fracionada (EV)	4-6h
Foundaparinux	Arixtra®	36-42h
Heparina de baixo peso molecular	Enoxaparina / Clexane® (profilático)	12h
	Enoxaparina / Clexane® (terapêutico)	24h
Warfarin (antagonista vit. K)	Marevan®	5 dias + INR<1.5
Dabigatrana	Pradaxa®	72h
	ClCr normal (>80ml/min)	
	ClCr 50 a 79ml/min	4 dias
	ClCr 30 a 49ml/min	5 dias
	ClCr <30ml/min	Não puncionar neuroeixo
Rivaroxabana	Xarelto®	72h
Apixabana	Eliquis®	72h
Endoxabana	Lixiana®	72h
	Savaysa®	
Betrixabana	Bevyxxa®	72h



INSULINAS

MEDICAÇÕES	NOMES	SUSPENSÃO
Ultralenta	Degludeca (<i>Tresiba</i> ®) Glargina (<i>Lantus</i> ®)	Reduzir 20-30% da dose 72 horas antes do procedimento.
Longas	NPH (<i>Humulin L</i> ®, <i>Novolin L</i> ®, <i>Humalog Mix</i> ®) Detemir (<i>Levemir</i> ®) Degludeca (<i>Tresiba</i> ®) Glargina (<i>Lantus</i> ®)	Reduzir 20-30% da dose na noite anterior da cirurgia até o final do período de jejum.
NPH - Média duração	NPH (<i>Humulin L</i> ®, <i>Novolin L</i> ®, <i>Humalog Mix</i> ®)	Reduzir 50% da dose na manhã da cirurgia.
Rápidas	Regular (<i>Novarapid</i> ®, <i>Humulin R</i> ®, <i>Novolin R</i> ®)	Suspender durante o jejum
Ultrarápidas	Lispro (<i>Humalog</i> ®) Aspart (<i>Novarapid</i> <i>Glulisina (Apidra</i> ®)	Suspender durante o jejum

FITOTERÁPICOS

NOMES	SUSPENSÃO
Alho* (<i>EDA - não suspender</i>) Chá verde; Kava Kava; Erva de São João	7 dias
Ginkgo Biloba	36h
Ephedra	24h



GRUPO DE
ANESTESIOLOGISTAS
ASSOCIADOS
PAULISTA



ANTIPLAQUETÁRIOS

MEDICAÇÕES	NOMES	SUSPENSÃO
AAS	Aspirina®, Melhoral®	3 - 5 dias 7 dias*
Inibidores P2Y12	Clopidogrel (Plavix®, Iscover®) Prasugrel (Effient®) Ticlopinidina (Ticlid®)	5-7 dias 7-10 dias 10 dias
Inibidores ADP	Ticagrelor (Brilinta®) Cangrelor (Kengreal®)	5-7 dias 3 horas
Inibidores da fosfodiesterase	Cilostazol (Pletal®, Vasoguard®) Dipiridamol (Persantin®)	48 horas 24 horas
Inibidores IIb/IIIa	Abciximab (Reopro®) Eptifibatide (Integrilin®) Tirofiban (Aggrastat®)	24-48 horas 4-8 horas 4-8 horas

*Se paciente de baixo risco cardiovascular e cirurgia de alto risco de sangramento

Obs.: Para neuroeixo considerar tempo máximo, exceto AAS



GRUPO DE
ANESTESIOLOGISTAS
ASSOCIADOS
PAULISTA